

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

〈痔疾用薬〉 ぢの痛み・はれ・かゆみに **ジーベクトル坐剤**

ジーベクトル坐剤は、痔の治療に有効なプレドニゾン酢酸エステル、リドカインなど5種の有効成分を配合した痔疾用坐剤で痔の痛み、はれ、かゆみ、出血の不快な4つの症状の改善にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

〔用法・用量〕

次の量を肛門内に挿入してください。


年 齢	1回量	1日使用回数
成人(15才以上)	1個	1~3回
15才未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させないでください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3) 肛門にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を厳守してください。

〔坐剤のとり出し方・挿入の仕方〕

- ①ミシン目より1個 切りはなします。
- ②上部の開け口を左右に引きはがし、坐剤を取り出します。
- ③肛門内に坐剤を挿入します。すわった状態で坐剤を入れ、手でおさえながら肛門に力を入れながらゆっくり立ち上がると、簡単に挿入することができます。



〔成分・分量〕1個(1.2g)中

はたらき	成分	分量
痔の痛みとかゆみをおさえます。	リドカイン	60mg
痔のはれ、出血をおさえます。	プレドニゾン酢酸エステル	1mg
傷の治りをたすけ、組織を修復します。	アラントイン	20mg
痔による炎症をおさえます。	グリチルレチン酸	6mg
血行を良くし、うっ血をおさえます。	トコフェロール酢酸エステル	50mg

添加物としてハードファット、軽質無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(30℃以下)に保管してください。特に夏期は冷蔵庫に保管してください。
- (2) 坐剤の先を下向きにして保管してください。(軟化したときの坐剤の変形を防ぐため。)
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

痔治療のポイント

1. トイレでは無理にいきまず3分以内を心がけましょう。排便後は温水便座やぬるま湯で洗うなど、肛門を清潔にしましょう。ペーパーで強くこすらないようにしましょう。
2. 便通をよくするために規則正しい生活と運動をしましょう。野菜や繊維質を多くとりお酒や刺激物をひかえましょう。
3. 患部を清潔にするため毎日の入浴を心がけましょう。入浴中は、おしりに負担のないリラックスした姿勢で。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。
奥田製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 (06)6351-2100 (代表) 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)



KUDA 奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<http://www.okudaseiyaku.co.jp>