

製造番号

使用期限



15g

きれ痔なによる かゆみ・痛み・はれ・出血に



# オシリン軟膏

さらっと塗れてへたつかない軟膏タイプ

第②類医薬品

がまんできない症状を抑えます。

第②類医薬品 15g

# オシリン軟膏

さらっと塗れてへたつかない軟膏タイプ

3つの作用で

殺菌作用

かゆみ止め作用

消炎作用



販売名：オシリン（外用痔疾用薬）

第②類医薬品

### 効能・効果

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

### 用法・用量

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。

### 成分・分量（100g中）

- ヒドロコルチゾン酢酸エステル……………0.5g
  - リドカイン……………3.0g
  - 酸化亜鉛……………4.0g
  - インプロピルメチルフェノール……………0.1g
  - クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.2g
  - アラントイン……………1.0g
  - グリチルレチン酸……………0.3g
  - トコフェロール酢酸エステル……………3.0g
- 添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

### 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



### ▲ 使用上の注意

#### ⓧ してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
- 1. 次の人は使用しないでください
  - 患部が化膿している人。
  - 2. 長期連用しないでください

#### ⓧ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室 ☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 協和薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

オシリン軟膏

第②類医薬品

オシリン軟膏

第②類医薬品

