

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔 疾 用 薬

ザッスル[®]AX軟膏

第②類医薬品

- 痔疾患は、静脈のうっ血が原因となって、炎症、痛み、かゆみ、出血を引き起こします。さらに肛門部の抵抗力が低下すると、腸内細菌や化膿菌等の感染によって症状が悪化して、複雑な痔となってしまいます。
このような痔疾患の治療には、まず局所の炎症を鎮め、痛みや出血の原因を早めに正しい方法で取り去ることが大切です。
- ザッスルAX軟膏は、激しい痔の痛み・かゆみ・出血等の諸症状に効果のある薬剤を配合した痔疾患の軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 肛門部にのみ使用すること。

成分・分量 (1g中)

成分	含量	はたらき
リドカイン	30mg	痔の痛みとかゆみをおさえます。
プレドニゾロン酢酸エステル	1mg	炎症をおさえ、痔のはれ、かゆみ、出血をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	患部の殺菌・消毒をおこないます。
アラントイン	10mg	傷の治りをたすけ、組織を修復します。
トコフェロール酢酸エステル	30mg	患部の血流を良くし、うっ血をおさえます。

添加物：白色ワセリン、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、パルミチン酸デキストリン、ジメチルポリシロキサン、ハッカ油

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用すること。

【だれにでもかんたんにできる痔の養生法】

- (1) 散歩や軽い体操など適度な運動を行うと、全身の血液の流れを良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。
- (2) 毎日の入浴は、患部を清潔にするだけでなく、全身の血液の流れも良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。ややぬるめのお湯にゆっくりと浸かってください。
- (3) お酒、タバコ、からし等の刺激物は、痔の大敵のうっ血をおこしますので、できるだけ控えるように気をつけてください。
- (4) 便秘になると痔を悪化させてしまいます。肉類を控え、野菜や果物をたっぷり食べて便秘にならないように気をつけてください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記をお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室
電話 0595-21-3200
受付時間 9:00～17:00 (土、祝日を除く)

製造販売元



中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5