

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 痔 疾 用 薬

### 痔の痛み・はれ・かゆみに スパルティスヂエース軟膏

#### 第②類医薬品

スパルティスヂエース軟膏は、痔の治療に有効なヒドロコルチゾン酢酸エステル、リドカイン、酸化亜鉛など7種の有効成分を配合した痔疾用軟膏で痔の痛み、はれ、かゆみ、出血の不快な4つの症状の改善にすぐれた効果を発揮します。



#### 使用上の注意



##### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

##### 1. 次の人は使用しないこと

患部が化膿している人。

##### 2. 長期連用しないこと



##### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

##### 3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 【効能・効果】

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

## 【用法・用量】

1日1～3回、適量を肛門部に塗布する。

### ＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 肛門部にのみ使用すること。

## 【成分・分量】 (100g中)

成分	含量	はたらき
リドカイン	3g	痔の痛みとかゆみをおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g	痔のはれと出血をおさえます。
酸化亜鉛	4g	患部を保護し、炎症をおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部の殺菌・消毒をおこないます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.2g	痔の炎症とかゆみをおさえます。
アラントイン	1g	痔の炎症をおさえ、傷口の回復を早めます。
トコフェロール酢酸エステル	3g	患部の血流を良くし、うっ血をおさえます。

添加物として白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、サラシミツロウ、パラフィン、セスキオレイン酸ソルピタン、ハッカ油を含有する。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。

### 〔痔の養生法〕

- (1) 散歩や軽い体操など適度な運動を行うと、全身の血液の流れを良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。
- (2) 毎日の入浴は、患部を清潔にするだけでなく、全身の血液の流れも良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。ややぬるめのお湯にゆっくりと浸かってください。
- (3) お酒、タバコやからし等の刺激物は、痔の大敵のうっ血をおこしますので、できるだけ控えるように気をつけてください。
- (4) 便秘になると痔を悪化させてしまいます。肉類を控えて、野菜や果物をたっぷり食べて便秘にならないように気をつけてください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

グロー薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話(06)6351-5331(代表)

(午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

発売元



グロー薬品工業株式会社

大阪市中央区内淡路町1丁目3番2号

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5