

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 〈外用痔疾用薬〉

第②類医薬品

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

# オノフェH軟膏EXα

- ◆オノフェH軟膏EXαは痔の初期の代表的な症状となっている、痛み、出血、はれ、かゆみを緩和する目的で、それらの症状に適切な有効成分を選んで配合した軟膏です。
- ◆痔はそのままにしておくとも慢性化して治りにくくなってしまいます。痔はひとりで苦しまず恥ずかしがらず早めの適切な手当てが大切です。



## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。  
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

## 【用法・用量】

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)肛門部にのみ使用してください。

## 【成分・分量】(100g中)

プレドニゾロン酢酸エステル…0.1g	リドカイン……………3.0g
イソプロピルメチルフェノール…0.1g	クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.2g
アラントイン……………1.0g	グリチルレチン酸……………0.3g
トコフェロール酢酸エステル…3.0g	トメントール……………0.1g



添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】


- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。(①→②)

●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。



折り曲げないでください。



折りたたまないでください。

## 治療のポイント

- 入浴は患部の血行を改善するので、毎日入るよう心がけましょう。
- 便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通をととのえましょう。
- アルコール類・刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。
- すわり続ける等、同じ姿勢で長くいると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142