

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

〈外用痔疾用薬〉
痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

サフィニア[®]EX注入軟膏

第②類医薬品

- ◆サフィニアがEX注入軟膏は痔の初期の代表的な症状となっている、痛み、出血、はれ、かゆみを緩和する目的で、それらの症状に適切な有効成分を選んで配合した軟膏です。
- ◆痔はそのままにしておくとも慢性化して治りにくくなってしまいます。痔はひとりで苦しまず恥ずかしながら早めの適切な手当てが大切です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)患部が化膿している人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。排尿困難。(5)次の診断を受けた人。緑内障。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
□のかわき、眠気
4. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

され痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

裏面もお読みください。

〔用法・用量〕

●ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。(肛門内に注入する場合)

年 齢	1 回量	1 日使用回数
成人(15歳以上)	1 個	1～2 回
15歳未満	使用しないこと	

又は


●次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。(肛門部に塗布する場合)

年 齢	1 回量	1 日使用回数
成人(15歳以上)	適量	1～3 回
15歳未満	使用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

(1)肛門部にのみ使用してください。(2)肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用してください。(3)用法・用量を厳守してください。

〔注入する場合〕



〔塗布する場合〕



●本製品は注入式のため容器に軟膏が少し残りますが、残量を見込んで充てんしています。また、寒い時期や低温で保管した場合は、軟膏が硬くなり、出しにくくなりますが手の中で容器を握って暖めると軟らかく出しやすくなります。

〔成分・分量〕 1個(2g)中

成 分	分 量	はたらき
プレドニゾン酢酸エステル	1mg	抗炎症作用により、出血、はれ、かゆみをしずめます。
リドカイン	60mg	患部の痛み、かゆみをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	炎症とかゆみをおさえます。
アラントイン	20mg	傷の治りをたすけ、組織を修復します。
イソプロピルメチルフェノール	2mg	細菌の感染をおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	50mg	血行をよくし、うっ血の改善をたすけます。

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、白色ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。(5)使用済みの容器は、トイレに流さないでください。

痔治療のポイント

1. トイレでは無理にいきまず、3分以内を心がけましょう。排便後はぬるま湯で洗うなど、肛門を清潔にしましょう。ペーパーで強くこすらないようにしましょう。
2. 便通をよくするために規則正しい生活と運動をしましょう。野菜や繊維質を多くとりお酒や刺激物をひかえましょう。
3. 患部を清潔にするため毎日の入浴を心がけましょう。入浴中は、おしりに負担のないリラックスした姿勢を心がけましょう。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの店又は下記にお願いいたします。
万協製薬株式会社「お客様相談室」
 電話 0598-30-5376
 受付時間 10:00～17:00
 (ただし、土、日、祝日を除きます。)

発売元

KUDA 奥田製薬株式会社
 大阪市北区天満1丁目4番5号
<http://www.okudaseiyaku.co.jp/>

製造販売元

BANKYO 万協製薬株式会社
 三重県多気郡多気町五桂1169-142