

第②類医薬品 **エフカイド軟膏EX**

**かゆみ、はれ
痛み、出血に**

15g **軟膏タイプ**

3種の作用
患部に働く

鎮痛成分

抗炎症成分

消毒成分

第②類医薬品 **エフカイド軟膏EX**

かゆみ、はれ、痛み、出血に

15g **軟膏タイプ**

肛門の
くり返す

痔疾用薬 **肛門のくり返す**

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔など

かゆみ・痛み

肛門のくり返す

販売名 **エフカイド軟膏EX** 第②類医薬品

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

❌ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。患部が化膿している人。2. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒
用法・用量 1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。
(用法・用量に関連する注意)
(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 肛門部にのみ使用してください。
成分・分量 (100g中) ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g、リドカイン 3.0g、酸化亜鉛 4.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g、アラントイン 1.0g、グリチルリチン酸 0.3g、トコフェロール酢酸エステル 3.0g
添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

製造販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五柱 1169-142

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お客様相談室 電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)