

痔疾用外用薬
【販売名】**ラホヤA注入軟膏EX** 開封口 **第②類医薬品** 30個

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. **次の人は使用しないでください。**
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が化膿している人。
2. **本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。**
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. **使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。**
(眠気等があらわれることがあります。)

4. **長期連用しないでください。**

■ 相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。 排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。 線内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわり、眠気

4. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(上段は使用期限、
下段は製造番号です)

【効能・効果】
きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和





【用法・用量】

年 齢	用 法	1回量	1日使用回数
成 人 (15歳以上)	注 入	1 個	1~2回
	塗 布	適 量	1~3回
15歳未満	使用しないこと		

【注入する場合】ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。
【塗布する場合】肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

〈用法及び用量に関連する注意〉
(1) 肛門部にのみ使用してください。(2) 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

〈注入する場合〉 **〈塗布する場合〉**

① 	② 	① 	② 
キャップを取りボディを押し軟膏を少し先端部に出します。	ノズルを肛門内に挿入しボディを押し軟膏を少量ずつ注入して押しこめ、最後まで引きぬいてください。	キャップを取り、軟膏をそのまま患部に塗布してください。	ガーゼなどにのぼして患部に貼ってください。

●本製品は注入式のため容器に軟膏が少し残りますが、残量を見込んで充てんしています。また、寒い時期や低温で保管した場合は、軟膏が硬くなり、出しにくくなりますが手の中で容器を握って温めると軟らかく出しやすくなります。

+ minacolor

きれ痔、いぼ痔による
痛み、出血、はれ、かゆみに

ラホヤA 注入軟膏EX

外に塗る 中に注入

痔疾用外用薬 **第②類医薬品** 30個入

【成分・分量】 1個(2g)中

プレドニゾン酢酸エステル … 1mg アラントイン … 20mg
リドカイン … 60mg イソプロピルメチルフェノール … 2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 … 4mg トコフェロール酢酸エステル … 50mg

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ワセリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。
(5) 使用済みの容器は、トイレに流さないでください。

【発売元】
株式会社ミナカラ
<https://minacolor.com/>

【製造販売元】
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

薬剤師のアフターサポート
 ミナカラでは、お薬について薬剤師に相談できます。
 商品購入はこちら▶

(お問合わせ) ミナカラ お客様相談窓口
☎03-5544-8440
受付時間: 10:00~17:00(平日・月-金)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

2g×30個入り
MADE IN JAPAN 


4 535653 002362