

その他	刺激感、化膿
泌尿器	排尿困難
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
副作用	症状

1. 用法・用量 (1) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(2) 排便時の痛みが激しいときは、排便の前に入挿入しておくと、痛みを和らげやすくなります。(3) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(4) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(5) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。

2. 注意 (1) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(2) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(3) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(4) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(5) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。

3. 効能・効果 (1) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(2) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(3) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(4) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(5) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。

4. 剤形 錠剤

1. 成分 (1) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(2) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(3) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(4) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(5) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。

2. 用法・用量 (1) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(2) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(3) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(4) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(5) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。

3. 効能・効果 (1) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(2) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(3) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(4) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。(5) 本剤は、排便時に油のようなたんじり状の便が出る場合に、排便直前に挿入し、指で十分に押し込んでください。

4. 剤形 錠剤

副作用

製造販売元  
万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五柱1169-142  
副作用被害救済制度  
☎0120-149-931


万協製薬株式会社  
「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます)

つらい痔の痛み、  
かゆみ、出血に

8つの有効成分  
炎症を抑える  
痛み・かゆみを抑える

# つらい痔の痛み、 かゆみ、出血に

15歳以上

 坐剤タイプ	プレドニゾン酢酸エステル配合	10個入
	内側の痛みをしっかり作用	
	<b>エプールH坐剤EXα</b> 第②類医薬品	

8つの有効成分  
炎症を抑える  
痛み・かゆみを抑える

【坐剤の取り出し方・挿入法】



- ① 1個をミシン目から切り離した後、図のように合わせ目を左右に引き離して坐剤を取り出してください。
- ② 坐剤の底を持ち、先から肛門内に入るまで、指で十分に押し込んでください。

- 排便時の痛みが激しいときは、排便の前に入挿入しておくこと、痛みを和らげやすくなります。
- 坐剤が外に出ないように挿入直後の激しい運動はなるべく避けるようにしてください。
- 挿入後の排便時に油のようなものが出る場合がありますが、これは油脂性基剤の溶けたものであり心配ありません。

紙

この面が底になるようにして、30℃以下で保管してください

上段は使用期限、下段は製造番号