

エフカイA 注入軟膏 EX 第②類医薬品

痔の痛み・出血
内部に注入
2g×10個
外部に塗る

アトニゾロニ酢酸エステル／リドカイN配合 注入軟膏

6つの有効成分配合

内部に注入
外部に塗る

痔の痛み・出血
内部に注入
2g×10個
外部に塗る



【保管及び取り扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない温気
の少ない涼しい所に密栓して保
管してください。(2)小児の手の
届かない所に保管してください。
なったり品質が変わります。(4)使用期限を過ぎた製品は使
用しないでください。開封後は
品質保持のため、なるべく早く
使用してください。(5)使用済みの
の容器は、トイレットに流さないで
ください。

エフカイA 注入軟膏 EX 第②類医薬品
痔の痛み・出血

副作用報告数済制度 ☎ 0120-149-931

上段は使用期限
下段は製造番号

6つの有効成分配合 2g×10個

エフカイA 注入軟膏 EX 第②類医薬品
痔の痛み・出血

電話 0598-30-5376 受付時間 10:00～17:00 (ただし、土、日、祝日は除きます) 万協製薬株式会社 「お客様相談室」
製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142

エフカイA 注入軟膏 EX 第②類医薬品
痔の痛み・出血
6つの有効成分配合

【効能・効果】きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
【用法・用量】

年齢	用法	1回量	1日使用回数
成人 (15歳以上)	注入	1個	1～2回
	塗布	適量	1～3回
15歳未満	使用しないこと		

【注入する場合】ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。
【塗布する場合】肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。
【用法及び用量に際する注意】
(1)肛門部へのみ使用してください。(2)肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入してください。(3)用法・用量を厳守してください。

【注入する場合】

① キャップを取り、ボディを押し軟膏を少し先端部に押し出します。

② ノズルを肛門内に挿入しボディを押しゆっくり注入して押し込まないようにしてください。

※全量を1回で注入してください。

【塗布する場合】

① キャップを取り、軟膏をそのまま患部に塗布してください。

② カーゼなどにのばして患部に貼ってください。

※一度塗布した容器は再度、注入に使わないでください。

●本製品は注入式のため容器に軟膏が少し残りますが、残量を見込んで充てんしています。また、寒い時期や低温で保管した場合は、軟膏が固くなり、出しにくくなりますが手の中で容器を握って暖めると軟らかく出しやすくなります。
【成分・分量】1個(2g)中／アトニゾロニ酢酸エステル1mg、リドカイン60mg、クロロブエニラミンマレイン酸塩4mg、アラトイン20mg、イソプロピルメチルフェニール2mg、トコフェロール酢酸エステル50mg添加物として、ポリオキシエチレン硬脂酸ヒマシ油、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸リセリン、ワセリンを含有します。