

痔の痛み、出血

【第②類医薬品】 エフカイA注入軟膏EX

MEDICINE FOR

2g×10個
はれ、かゆみに

内部に注入
外部に塗る
注入軟膏タイプ

2g×10個

MEDICINE FOR HEMORRHOIDS

痔の痛み、出血

はれ、かゆみに

6つの有効成分配合
フルニソロン酢酸エステル/
リドカイン配合



リドカイン配合

フルニソロン酢酸エステル/

【第②類医薬品】



【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい
場所に保管してください。(2)小瓶の手の
届かない所に保管してください。(3)他の
容器に入れ替えないでください。(4)使用
期限を過ぎた製品は使用しないでくだ
さい。(5)使用済みの容器は、トナリに流
さないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

上段は使用期限
下段は製造番号

痔の痛み、出血

MEDICINE FOR HEMORRHOIDS
はれ、かゆみに

6つの有効成分配合
フルニソロン酢酸エステル/
リドカイン配合



B2603

痔の痛み、出血

MEDICINE FOR

三重県多賀郡多賀町五桂1169-142
万協製薬株式会社
製造販売元
【お客相談室】
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます)

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読むよう大切に保管してください。

〈外用痔疾用薬〉

エフカイA注入軟膏EX 【第②類医薬品】

△ 使用上の注意

☒ してはけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1.次の人は使用しないでください。(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)患部が化膿している人。2.本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮痛去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3.使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。）4.長期連用しないでください。

※ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。排尿困難。(5)次の診断を受けた人。緑内障。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青ざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜 が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分 が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気。
4.10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 きれ痔（せけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】

年 齢	用 法	1回量	1日使用回数
成 人 (15歳以上)	注 入	1 個	1～2回
	塗 布	適 量	1～3回
15歳未満	使用しないこと		

【注入する場合】 ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

【塗布する場合】 肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

【用法及び用量に関連する注意】

(1)肛門部内のみ使用してください。(2)肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入してください。(3)用法・用量を厳守してください。

【注入する場合】



【塗布する場合】



●本製品は注入式のため容器に軟膏が少し残りますが、残量を見込んで充てています。また、寒い時期や低温で保管した場合は、軟膏が固くなり、出しにくくなりますが手の中で容器を握って暖めると軟らかく出しやすくなります。

【成分・分量】 1個(2g)中/フルニソロン酢酸エステル1mg、リドカイン60mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩4mg、アラントイン20mg、インプロピルメチルフェノール2mg、トコフェロール酢酸エステル50mg
添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、マクロゴール400、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリド、白色ワセリンを含有します。