

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1. 次の人は使用しないでください。患部が化膿している人。2. 長期連用しないでください。

### ☎ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

**【効能・効果】** きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

**【用法・用量】** 1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 肛門部にのみ使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

**【成分・分量】** (100g中) プレドニゾン酢酸エステル0.1g、リドカイン3.0g、インプロピルメチルフェノール0.1g、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.2g、アラントイン1.0g、グリチルレチン酸0.3g、トコフェロール酢酸エステル3.0g、トメントール0.1g 添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

開封口

## 第②類医薬品

〈外用痔疾用薬〉

**エフカイH軟膏EX $\alpha$**

製造販売元

**万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社  
「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 535653 002843



上段は使用期限、下段は製造番号