

ご使用に際して、この箱の記載内容を読み取ってください。また、必要に応じて医師に相談してください。

△ 使用上の注意

❑ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。患部が化膿している人。2. 長期連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

【効能・効果】 痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒
【用法・用量】 1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 肛門部にはのみ使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 (100g中) プレドニゾン酢酸エステル0.1g、リドカイン3.0g、イソプロピルメチルフェノール0.1g、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.2g、アラントイン1.0g、グリチルレチン酸0.3g、トコフェロール酢酸エステル3.0g、トメントール0.1g 添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

上段は使用期限、下段は製造番号



副作用発生時連絡先 0120-149-931

電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます)

「お客様相談室」
万協製薬株式会社

三重県多気郡五井町169-1169-742
万協製薬株式会社

〈外用痔薬用薬〉
エフカイH軟膏EXα

第②類医薬品

奇麗にのた
め、指が添付
文書を確認し
ています。

A& 8つの有効成分配合
プレドニゾン酢酸エステル/リドカイン配合

痔の痛み、はれ、かゆみ、出血に

MEDICINE FOR HEMORRHOIDS 外部に塗る軟膏タイプ

25g

第②類医薬品
エフカイH軟膏EX α

痔の痛み、はれ、かゆみ、出血に

痔の痛み、はれ、かゆみ、出血に

第②類医薬品
エフカイH軟膏EX α

