

有効成分配合
8つの

ヒドロコルチゾン酢酸エステル

炎症を抑える

リドカイン

かゆみ・痛みを抑える

痔の痛み・はれ・かゆみ・出血に

オシリエイド軟膏

肛門のかゆみ・痛みに

第②類医薬品

SELECT

販売名：オシリエイド軟膏

第②類医薬品

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)肛門部にのみ使用してください。

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

成分・分量(100g中)

ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g、リドカイン 3.0g、酸化亜鉛 4.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g、アラントイン 1.0g、グリチルレチン酸 0.3g、トコフェロール酢酸エステル 3.0g

添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

お客様相談室
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

△ 使用上の注意

⊗ [してはいけないこと]

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください。

■ [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



使用期限
製造番号

