

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に

DHC ジオサーマル <外用痔疾用薬>

第②類医薬品

DHCジオサーマルは、きれ痔やいぼ痔による痛み、かゆみや出血を鎮める成分と、うっ血を改善し、組織修復を促す成分を配合した痔の外用薬です。痔の不快感を和らげ、病状が快方に向かうのを助けます。肛門の内側の痔には注入、肛門の外側の痔には塗布してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が化膿している人。
- 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
緑内障、高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気
- 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面も必ずお読みください。

■ 効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

■ 用法・用量

肛門内に注入する場合

ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

年齢	1回量	使用回数
成人(15才以上)	1個	1日1~2回
15才未満	使用しないこと	

患部に塗布する場合


次の量を患部に塗布してください。なお、1回塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

年齢	1回量	使用回数
成人(15才以上)	適量	1日1~3回
15才未満	使用しないこと	

使用方法




1 キャップを外し、すべりをよくするために薬剤をノズル先端部から少し出してください。



2 ノズル部分を肛門内に挿入し、容器を押して薬剤をゆっくり注入し、押しのまま引き抜いてください。

使用方法



適量を患部にそのまま塗るか、ガーゼなどにのぼして患部にあててください。保管の際は、ティッシュペーパーなどでノズル先端部を拭き、キャップをしっかりしめて清潔に保ってください。

*注入式のため容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充填しています。

*寒い時期や低温で保管すると薬剤が硬くなることがありますが、容器を手で握ってあたためると軟らかくなります。

【用法・用量に関連する注意】

1. 肛門部にのみ使用してください。

2. 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用してください。

■ 成分・分量 1個(2.5g)中

成分	分量	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5.0mg	炎症、はれ、出血を抑え、痛み、かゆみを鎮めます。
ジブカイン塩酸塩	7.5mg	痛み、かゆみを鎮めます。
エフェドリン塩酸塩	15.0mg	出血を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	12.5mg	かゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	25.0mg	血行を改善し、うっ血を防ぎます。
アラントイン	20.0mg	組織を修復し、傷の治りを助けます。

添加物として、サラシミツロウ、スクワラン、流動パラフィン、パラフィン、ワセリンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。2. 15才未満の小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。5. 使用済みの容器等はトイレに流さないでください。

〈予防と改善に向けた習慣づけ〉

●排便時に長くいきまないように心がけましょう。●患部を清潔に保ちましょう。入浴は血行の改善にも効果があります。●食物繊維と水分を多めにとり、便秘に気をつけましょう。●アルコール類、香辛料などの刺激物を控えめにしましょう。●座り続けると患部がうっ血することがありますので、適度に体を動かしましょう。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029
受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1
0120-333-906 www.dhc.co.jp