



和漢薬本来の効き目をあなたに
摩耶堂の浸煎薬

ネオ腎仙湯

【効能効果】
腎炎、膀胱炎、尿道炎、
ムクミ、利尿減少

茶剤・1袋

すぐ出るむくみ、
くり返す膀胱炎に

15種の生薬からなる
日本生まれの和漢処方

【成分・分量】1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

タクシャ・・・1.2g	サンシシ・・・1.0g	ウワウルシ・・・2.0g
チョレイ・・・1.2g	シャクヤク・・・1.4g	シャゼンシ・・・1.2g
ブクリョウ・・・1.6g	ジオウ・・・1.2g	ポウコン・・・1.2g
ソウジュツ・・・1.4g	ポウイ・・・1.2g	インチンコウ・・・1.0g
ケイヒ・・・1.2g	キササゲ・・・1.6g	ニフトコ・・・1.6g

第2類医薬品

HR247A-02

この説明書きは本剤と
ともに保管し、服用の際
にはよくお読みください。

茶剤 ネオ腎仙湯

生薬製剤
第2類医薬品
20.0g×1袋

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 胃腸の弱い人(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5) 次の症状のある人: 食欲不振、吐き気、嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気、嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腰痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】腎炎、膀胱炎、尿道炎、ムクミ、利尿減少

【用法・用量】○通常成人1袋に水約600mlを加え約1/2量に煎じ詰め、1回約100ml・1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○通常成人1袋を3回・熱湯約150ml中にて振り出し、1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○8歳～15歳は成人の1/2量、4歳～7歳は成人の1/3量宛服用してください。

<用法・用量に関連する注意>(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 誤用の原因になったり品質が変わることがあります。(5) 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



4 987210 118038

製造販売元

ロート製薬グループ



摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先：「くすりの相談室」電話(078)929-0112
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



使用
期限
製造
番号

HR247B-02

カップで簡単!

マヤドーの煎じ薬



① 熱湯150mLにティーバッグを入れ



② かき混ぜながらしばらく待てば...



③ 1回分の出来上がり!
※ティーバッグは1日以内に3回使えます

【効能・効果】腎炎、膀胱炎、尿道炎、ムクミ、尿利減少

ネオ腎仙湯

靴下のゴム跡が消えにくい
時々、尿の濁りが気になる
いやなむくみ、繰り返す膀胱炎に

和漢のチカラを科学し、あなたへ



茶剤・1袋

第2類医薬品
HR247E-01

この説明書は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

茶剤 ネオ腎仙湯

第2類医薬品

生薬製剤 20.0g×1袋

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)胃腸の弱い人(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)次の症状のある人・食欲不振、吐き気、嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐
症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】腎炎、膀胱炎、尿道炎、ムクミ、尿利減少

【用法・用量】○通常成人1袋に水約600mlを加え約1/2量に煎じ詰め、1回約100ml・1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○通常成人1袋を3回・熱湯約150ml中にて振り出し、1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○8歳～15歳は成人の1/2量、4歳～7歳は成人の1/3量宛服用してください。

<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

タクシャ1.2g/チョレイ1.2g/ブクリョウ1.6g/ソウジュツ1.4g/ケイヒ1.2g/サンシシ1.0g/シャクヤク1.4g/ジオウ1.2g/ポウイ1.2g/キササゲ1.6g/ウワウルシ2.0g/シャゼンシ1.2g/ポウコン1.2g/インチンコウ1.0g/ニワトコ1.6g

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元 ロート製薬グループ
摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1



使用期限
製造番号

お問合せ先：「くすりの相談室」電話(078)929-0112
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問合せ先 0120-149-931

HR247F-01