


膀胱炎・むくみに腎仙散[®]

生薬製剤
第2類医薬品

販売名：腎仙散[®]（ジンセンサン）

膀胱炎の原因の多くは菌が引き起こす炎症です。
「腎仙散」は、原因菌に働く抗菌生薬ウワウルシを配合。
膀胱炎にしっかり効きます。※

※通常4～7日間の服用で原因菌を抑え込みますので、
痛み等の症状が治まった後も薬を残さず飲みきるようにしてください。



抗 菌

ウワウルシが膀胱炎の原因菌に働きかけます。

利 尿

タクシャ・ブクリョウ・ジオウ等が菌を尿で外へ押し出します。

抗炎症

インチンコウ・シャクヤク等が膀胱の炎症を改善します。

鎮 痛

シャクヤク・ボウイ等が排尿後の痛みなどを和らげます。

服用 ポイント

温かいお湯で服用いただくと、
より効果的かつ服用しやすくなります。

養生 ポイント

- トイレを我慢しないようにしましょう。
- 免疫力を下げないためにも、疲れやストレスを溜めないようにしましょう。
- 温かい飲み物を摂るなど、身体を冷やさないようにしましょう。



※製剤の特性から触感的に固まっているように感じられますが、分包品を振ることにより内容物が固まっていないことを確認できます。
※本剤を服用する際、口中の水分により口の中で固まったように感じるがありますが、効果に変わりはありませんのでそのまま服用ください。

和漢のチカラを科学し、あなたへ。～摩耶堂製薬～

漢方薬に日本の生薬「和薬」等を配合したものを「和漢薬」といい、日本人の体質に合わせて心身の不調をお手当てすることを目指しています。『摩耶堂製薬』のお薬は、和漢薬にさらに独自の工夫を加え、カラダの内側から効き目を現す処方です。現代社会がもたらす様々な心身の不調を整え、あなたの本来の健やかさを。摩耶堂製薬の想いです。




使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸の弱い人
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人 食欲不振、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

*5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

腎炎、ネフローゼ、腎盂炎、膀胱炎、ムクミ、利尿減少

【用法・用量】

次の量を食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人	1包	3回
8歳～15歳	1/2包	
4歳～7歳	1/3包	
4歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。 食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

1包1.5g・20包中に次の生薬より製したエキスを含有しています。

タクシャ……6.0g	ケ イ ヒ……6.0g	ジ オ ウ……6.0g	ウワウルシ……10.0g	チョレイ……6.0g
インチンコウ……5.0g	ボ ウ イ……6.0g	シャゼンシ……6.0g	ブクリョウ……8.0g	サンシシ……5.0g
ニワトコ……8.0g	ボウコン……6.0g	ソウジュツ……7.0g	シャクヤク……7.0g	キササゲ……8.0g

添加物としてカルメロースCa、無水ケイ酸を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又はくすりの相談室までお願い申し上げます。

「くすりの相談室」 078-929-0112 9:00～17:30(土、日、祝、弊社休日を除く)

製造販売元

ロート製薬グループ



摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1
https://www.mayado.jp

