

日本薬局方

山本漢方  
ウワウルシ  
「分包」

残尿感、排尿に際し

不快感のあるもの

ウワウルシ

簡単、便利な

ティーバッグタイプです。

J.P ウワウルシ

YAMAMOTO

第2類医薬品

あけくち

日本薬局方

# ウワウルシ

販売名 山本漢方ウワウルシ「分包」

## 【特徴】

本品は生薬の煎じ薬、ティーバッグタイプ

## △ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元

① 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

## 効能又は効果

残尿感、排尿に際し不快感のあるもの

## 用法及び用量

年 齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	1包 (5.0g)	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1回1包(5g)を、水約200mLをもって煮て、約130mLに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前又は食間に1日3回服用する。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

## 成分及び分量 1日量 3包(15g)中

成 分	分量	作 用
日本薬局方 ウワウルシ	15g	尿路消毒、 防腐、殺菌

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## 【その他】

○ウワウルシの煎じ方(大人15才以上)  
土ビン又はヤカン(アルミ、ステンレス製)にて水約200mLの中へ、本品1包を入れ、中の煎剤が軽く泡立つ程度の弱火にて、約130mLになるまで(10~15分)煎じ、火を止め袋を取りだしてください。1日3回(朝、昼、夜)同様の煎じ方で、服用してください。

○本品を煎じた後の保管

夏期は、長時間煎液を放置しますと、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。

## ウワウルシ豆知識

### ウワウルシ

### Arctostaphylos uva-ursi

ウワウルシの産地は主として、スペイン、フランス、ドイツなどで、効用はヨーロッパでは17世紀ごろから知られていました。19世紀前半になってからは、アメリカで知られるようになり日本へも伝えられ、日本薬局方には第一版より収載されているお薬です。

### 形態

北半球の高山又は寒冷地の原野に自生する常緑小低木で、茎は地にはって分枝し、直立、葉は互生し、短柄、葉身は卵形へら状で全縁。初夏に総状花序を頂生し、淡赤色の小鐘状花を付ける。液果は小球形で赤熟なのが特徴です。