

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ビタミンE主薬製剤

第3類医薬品

参寿EBカプセル

参寿EBカプセルは、トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）のほか、ベンフォチアミン（ビタミンB₁誘導体）、ニンジンやガンマーオリザノールなどを配合したカプセル剤です。

- 肩・首すじのこり、手足のしびれ、冷え（末梢血行障害や更年期）
- しもやけ（末梢血行障害） ●のぼせ（更年期） ●月経不順などの諸症状の緩和や改善に効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

【用法・用量】

次の量を、水又は白湯にて服用してください。
ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	2～3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	2～3回
7歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

〈PTPシートの取り出し図〉



裏面もよくお読みください。

【成分・分量】


1日量（6カプセル）中

成 分	分 量
理研ドライE-S500 〔トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）〕	600mg 〔300mg〕
ニンジン乾燥エキス	600mg (ニンジン2000mgに相当)
加工大蒜	70mg (大蒜7000mgに相当)
ベンフォチアミン（ビタミンB ₁ 誘導体）	34.57mg
ガンマーオリザノール	10mg
ウルソデオキシコール酸	30mg

添加物として、二酸化ケイ素、ケイ酸Al、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ゼラチン、赤色3号、黄色5号、青色1号、ラウリル硫酸Naを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）