

末梢血行障害による
手足のしびれ・冷え、しもやけ



冷え

肩・首すじのこり

にんにく抽出成分・ビタミンE・ビタミンB₁・B₆

180カプセル

新オキソロンE300
NEW OXORON E 300

第3類医薬品

ここから
開けてください

末梢血行障害による
手足のしびれ・冷え、しもやけ



冷え

肩・首すじのこり

にんにく抽出成分・ビタミンE・ビタミンB₁・B₆

新オキソロンE300
NEW OXORON E 300

第3類医薬品

180カプセル

用法・用量

成人(15歳以上) 1回2カプセル
7歳以上15歳未満 1回1カプセル
7歳未満服用しないでください
1日3回、食後に服用してください。
<用法・用量に関連する注意>
用法・用量を厳守してください。
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもと
に服用させてください。

成分・分量 6カプセル中

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 300mg
チアミン硝化物(ビタミンB₁) 18mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 36mg
理研オキソレデン末(にんにく抽出成分) 1000mg
添加物として、二酸化ケイ素、パレイシヨデンブ、炭
酸Ca、セルロース、無水ケイ酸を含み、カプセル本体
はヒプロメロース、酸化チタン、黄色三二酸化鉄を含
有します。

本品についてのお問い合わせ先
・お買い求めのお店
・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住所 東京都渋谷区代々木 3-46-16
電話 03-3370-7174 (代表)
受付時間 9:00~17:00 まで (土、日、祝日を除く)



4 976084 013280

使用期限

製造番号



販売名：新オキソロン E 300

第3類医薬品

服用に際して、この説明文をよくお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、便秘、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早く来たり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。
- 本剤は、開封後の保管の状況により、臭いがある場合がありますが、内容成分に変化はございませんのでご安心ください。
- PTPのアルミ箔が破れ、中身のカプセルが変質しないように、保管及び携帯にご注意ください。

使用のカプセルは、牛、豚などの動物性ではなく、植物性のセルロースカプセルを使用しております。
右図のように、カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で押して取り出しますが、余り力が強すぎますと、カプセルが割れる場合がありますので、ツメを立てず指先でやさしく押し出してください。(誤ってそのまま飲み込まないでください)



効 能

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ・ほてり
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

INDICATIONS

Relief of the following symptoms due to peripheral circulatory disturbances: stiffness in the shoulder and neck, numbness/chills in the limbs and chilblains Relief of the following symptoms in the climacterium: stiffness in the shoulder and neck, chills, numbness in the limbs and hot flashes, irregular menstruation (A physician or pharmacist should be consulted if there is no improvement after about one month of administration) Supplementation of Vitamin E in the following case: for the elderly

DOSAGE

Take the following dose, three times a day, after meals.
15 years and over 2 Capsules 7-14 years 1 Capsules.

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

発 売 元 日 邦 薬 品 工 業 株 式 有 限 公 司

東 京 都 渋谷 区 代 々 木 3 - 4 6 - 1 6

製 造 販 売 元 米 田 薬 品 工 業 株 式 有 限 公 司

奈 良 県 高 市 郡 高 取 町 市 尾 9 8 6

2406A