

販売名:
コンドロハイ900E
(ビタミンE主薬製剤)

第3類
 医薬品

使用上の注意 **[相談すること]**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 皮膚：発疹・発赤、かゆみ
 消化器：胃部不快感
- 服用後、便秘や下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩、首すじのこり、手足のしびれ、冷え、しもやけ
 - 更年期における次の諸症状の緩和：肩、首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
 - 月経不順
- ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：更年期

【用法・用量】

成人(15才以上) 1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。なお、15才未満は服用しないください。

【成分】

1瓶(50mL)中
 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900mg、コウジン乾燥エキス300mg(コウジン3000mgに相当)、ビタミンE酢酸エステル100mg、パントテニール20mg、ニコチン酸アミド12mg
 添加物：グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、スクラロース、アセシルアムK、クエン酸Na、カラメル、エリスリトール、フチルパラベン、安息香酸Na、クエン酸、香料、エタノール、トメントール、パニリン、pH調節剤



ゼリア新薬

コンドロハイ®
900E

紅参+コンドロイチン
 3,000mg 900mg
CHONDRO HI 900E

末梢血行障害による
肩・首筋のこり
手足の冷え

これらの
症状の緩和に

ビタミンE主薬製剤
第3類医薬品 50mL



ゼリア新薬

コンドロハイ®
900E

紅参+コンドロイチン
 3,000mg 900mg
CHONDRO HI 900E

末梢血行障害による
肩・首筋のこり
手足の冷え

これらの
症状の緩和に

ビタミンE主薬製剤
第3類医薬品 50mL

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

末梢血行障害による
手足の冷え
肩・首筋のこり
 これらの症状の緩和に



＜手指のイメージ図＞

第3類医薬品

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



4 987103 047902

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
 東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
 受付9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

コンドロハイはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。



MADE IN JAPAN
 品名コード 4272