



ゼリア新薬

コンドロハイ®

900 E

紅参+コンドロイチン

3,000mg 900mg

CHONDRO HI 900E

肩・首筋のこり
手足の冷え
末梢血行障害による

これらの
症状の緩和に

ビタミンE主薬製剤

第3類医薬品

販売名:
コンドロハイ900E
(ビタミンE主薬製剤)

第3類
医薬品

使用上の注意 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
消化器：胃部不快感
3. 服用後、便秘や下痢の症状があらわることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

[用法・用量]

成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。なお、15才未満は服用しないでください。

[成 分] 1瓶(50mL)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900mg、コウジン乾燥エキス300mg(コウジン3000mgに相当)、ビタミンE酢酸エステル100mg、パンテノール20mg、ニコチン酸アミド12mg

添加物：グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、スクラロース、アセスルファムK、クエン酸Na、カラメル、エリストール、ブチルパラベン、安息香酸Na、クエン酸、香料、エタノール、I-メントール、バニリン、pH調節剤

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 本剤はまれに混濁することがあります、薬効には変わりありません。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

末梢血行障害による

手足の冷え
肩・首筋のこり
これらの症状の緩和に



<手指のイメージ図>

第3類医薬品

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
受付9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

コンドロハイはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

MADE IN JAPAN

品名コード 4272