

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

天然ビタミンE剤

ビタタイムE

γ-オリザノール配合

特 徴

ビタタイムEは、植物油から抽出・精製した生理活性が高い天然ビタミンEをソフトカプセルに充填しています。
天然ビタミンEとγ-オリザノールが効果的に働き、冷えや手足のしびれ、更年期の不快感などを改善します。



使用上の注意



相 談 す る こ と

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|-------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 胃部不快感 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
 - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：更年期

用法・用量

次の1回量を水又はぬるま湯で、かまずに服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
15才以上	1カプセル	1日2～3回
15才未満	服用しないでください	

ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は、朝昼晩服用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を厳守してください。

▼裏面もお読みください

成分・分量 3カプセル中

d-α-トコフェロール（天然ビタミンE）・・・・・・ 300mg
γ-オリザノール・・・・・・ 10mg
添加物：小麦胚芽油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール液、パラベン、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

ビタミンEとγ-オリザノールの作用

- 過酸化脂質（血管のサビ）の増加を防ぎ、末梢血行障害を防ぎます
体内の脂肪が変質すると、体の中のサビといわれる「過酸化脂質」ができます。この「過酸化脂質」は血管壁についたりして、末梢血行障害を起こす原因になります。過酸化脂質の増加を防止する働きのあるビタミンEは、過酸化脂質が増加しやすくなる老年期に補給が大切です。
- 全身の血液の流れをよくします
血管は、年とともに少しずつ狭くなって、血液の流れが悪くなります。ビタミンEは細い毛細血管の働きをよくし、血液の循環をスムーズにすることで、体のすみずみまで酸素や栄養素を届け、末梢血行障害による肩・首すじのこり、手足のしびれや冷えなどをやわらげます。
- 更年期にみられる症状を緩和します
ビタミンEは内分泌系の中核である脳下垂体に作用し、γ-オリザノールは自律神経系の中核である間脳に作用します。これらが効果的に働き、ホルモンバランスの乱れや自律神経失調からくる更年期の不快な症状を緩和します。

※各種ビタミンEの生理活性

ビタミンEには合成（dl体）と天然（d体）の2つのタイプと、種々（α型、β型、γ型、δ型）のビタミンEがあります。
そのうち、ビタミンEとしての効力（生理活性）が高いのは天然（d体）のアルファ（α）型です。

	ビタミンEの種類	生理活性*
合成（dl体）	dl-α-トコフェロール酢酸エステル	1.00
	dl-α-トコフェロール	1.10
天然（d体）	酢酸d-α-トコフェロール	1.36
	d-α-トコフェロール	1.49
	d-β-トコフェロール	0.75
	d-γ-トコフェロール	0.15
	d-δ-トコフェロール	0.01

※dl-α-トコフェロール酢酸エステルを1.00とした場合の生理活性

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。ただし、品質保持のため、冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 湿気によりカプセルが変質することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 服用のつどビンのフタをしっかりとめてください。（吸湿し品質が変わります。）
- (6) ビンの中の詰め物は、輸送中のカプセル破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (9) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2