

服用前にこの説明文書を必ず読むこと。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

第3類医薬品

ビタミンE主薬製剤

# ビタローカルII

天然型ビタミンE  
フルスルチアミン塩酸塩  
イノシトールヘキサニコチン酸エステル  
配合

## ⚠️ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
便秘、下痢
- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
  - 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
  - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

(裏面に続きます)

## 用法・用量

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	3回(朝昼晩)
15歳未満	服用しないこと	

●用法・用量を厳守すること

成分・分量、作用 1日量3カプセル中に次の成分を含む。

成 分	3カプセル中	主な作用
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)	300mg	抗酸化作用により、過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害を改善する。
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB <sub>1</sub> )	25mg	神経や筋肉の機能維持に重要な役割をはたす。
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg	過酸化脂質の生成を抑制し、血管や神経系を正常に保つ。
イノシトールヘキサニコチン酸エステル	100mg	末梢の血管を広げ、血液の流れをよくするとともに、神経の働きを正常に保つ。
$\gamma$ -オリザノール	10mg	神経の働きを活性化し、更年期における諸症状を緩和する。

添加物：ポリソルベート80、サラシミツロウ、サフラワー油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、酸化チタン、黄色5号

●本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色になることがある。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先  
田村薬品工業株式会社 お客様相談室  
06-6203-5151  
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

**田村薬品工業株式会社**  
奈良県御所市西寺田50