

J A C K O E C A P S U L E

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

ビタミンE主薬製剤

若 魁 E カプセル

若魁Eカプセルは、生理活性(効力)が高い天然ビタミンEと薬用人参をソフトカプセルに充填した医薬品です。若魁Eカプセルは、天然ビタミンEと薬用人参の働きにより末梢血行障害や更年期における「肩・首すじのこり」や「手足のしびれ・冷え、のぼせ」などの症状を効果的に改善します。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります
出血が長く続く場合は、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 更年期における次の諸症状の緩和
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
 - 末梢血行障害による次の諸症状の緩和
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」
- 次の場合のビタミンEの補給
老年期

用法・用量

次の量を毎食後に服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください

(2) カプセルの取り出し方 PTP包装の場合は、図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面アルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)



なぜ、若甦Eカプセルは食後の服用が効果的なのですか？

ビタミンEは油に溶ける脂溶性ビタミンで胆汁酸などの働きをかりて吸収されるために、胆汁酸が分泌している食後に服用するのが効果的です

成分・分量

成人1日量(3カプセル)中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
d- α -トコフェロール (天然ビタミンE)	300mg	1. ホルモンを分泌する器官の働きを助けて分泌を調整し、更年期による冷え、肩こりを改善します 2. ビタミンEは、脂肪の酸化を防ぎますので、過酸化脂質が増加しやすい老年期には、特に補給が大切です 3. 全身の血液の流れをよくします
ニンジン乾燥エキス	60mg (原生薬として600mg)	1. 血液の流れをよくして、女性ホルモンの分泌を促します 2. 過酸化脂質の増加を抑制します

添加物として、ダイズ油、硬化油、カプセルにコハク化ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、ポリソルベート80、三二酸化鉄を含有しています

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
(瓶入りの場合は密栓して保管してください)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

・お買い求めのお店

・日邦薬品工業株式会社 学術情報室

住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16

電話：(03)3370-7174(代表)

受付時間：午前9:00から午後5:00まで

(土、日、祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開35-3