

アリナロングZ Xコンドロ錠

第3類医薬品

— コンドロイチン硫酸、フルスルチアミン、ビタミンB₆、B₁₂、E 配合 —

- 中高年の膝と腰の痛みの大半は、変形性関節症といわれ、骨と骨の間のクッションの役割を果たしている関節軟骨が衰え、すり減って起こる場合が多いのです。コンドロイチンは関節軟骨内に多く含まれ、弾力性や保水のはたらきがありますが、加齢とともに弱くなりますので、痛みをなくすために補給せねばなりません。
- 本剤は、コンドロイチン硫酸を主体に、神経や筋肉に強く作用するフルスルチアミン（ビタミンB₁誘導体）を始め、ビタミンB₆、B₁₂、Eを効果的に配合していますので、ひざ、関節痛、腰痛、神経痛、五十肩などに、優れた効果があります。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などよりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、消化器に吐き気・嘔吐、口内炎の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合、又は1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 成分・分量 6錠(1日量)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム … 900mg ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) …… 30mg
 フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁誘導体) シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) …… 60µg
 (フルスルチアミンとして100mg) …… 109.16mg トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) …… 30mg

添加物として、塩酸グルコサミン(緩衝剤)、セルロース、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、無水ケイ酸、二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、黄色三酸化鉄を含有します。

● 用法・用量

- | | | | |
|------------|------|------------------|--------------|
| 15歳以上 | 1回2錠 | 1日3回 | 食後に服用してください。 |
| 7歳以上 15歳未満 | 1回1錠 | 7歳未満は服用しないでください。 | |
- 〈用法・用量に関連する注意〉
- 用法・用量を厳守してください。
 - 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 効能

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
 - 脚気
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

(保管及び取扱い上の注意)

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

- 空気中の湿気などにより、変色など錠剤が変質することがありますので、次のことを守ってください。○使用後は、必ず密栓してください。○ぬれた手で触れないでください。○開封後は吸湿のおそれがありますので、ビンの中の詰め物を捨ててください。(詰め物は輸送中、錠剤の破損を防ぐためのものです。)

