

31日分 124錠 第2類医薬品

奈良大和生薬兆BG錠s

▲ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、消化器部に吐き気・嘔吐、口内炎の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合、又は1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

発 売 元 株式会社奈良大和生薬
奈良県奈良市二条大路南1-2-11

製造販売元 米田薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町市尾986

容器の中の詰め物と箱の中の紙は錠剤や瓶の破損防止のために入っています。開封後に捨ててください。

成分・分量 1日量:4錠中

- フルスルチアミン塩酸塩…66.81mg
(フルスルチアミンとして61.21mg)
- ピリドキシン塩酸塩…30.60mg
- シアノコバラミン…36.72μg
- ガンマ-オリザノール…6.12mg
- コンドロイチン硫酸エーステルナトリウム…240mg
- ポワイ乾燥エキス…240mg(原生薬換算3,000mg)

添加物として、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、無水ケイ酸、ステアリル酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄を含有します。

効能・効果

- ・次の諸症状の緩和: 神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目の痛み・目の奥の痛み)
- ・脚氣
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- ・次の場合のビタミンB₁の補給: 肉体疲労時、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

第2類医薬品

奈良大和生薬 兆 BG 錠s



生薬
紀念
要
かなめシリーズ

第2類医薬品

つらい 膝・腰・肩の痛み 飲んで効く医薬品

奈良大和生薬
兆 BG 錠s
ボウイ乾燥エキス
コンドロイチン
フルスルチアミン
ガンマ-オリザノール
シアノコバラミン
ピリドキシン

31日分 124錠



開封年月日

開封時に記入してください。

服用前に、この箱に記載の説明内容をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヵ月以内の服用を目安にしてください。
- 水分が錠剤につきますと、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用
期限
製造
番号



お問い合わせ先 株式会社奈良大和生薬

医薬品相談窓口 ☎ 0120-005-189

受付時間 9:00~18:00(年中無休)

1309

2110A



箱:紙
瓶:ガラス
キャップ:金属



4 954391 106093