

第3類医薬品

ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

# 新ヒトミタン錠

## 製品の特徴

新ヒトミタン錠には、1日量としてコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを900mg配合しました。  
また、新ヒトミタン錠は、吸収の良いフルスルチアミンをはじめビタミンB群を配合したビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤です。

## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚 気  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回（朝昼晩）
11歳以上15歳未満	2錠	
11歳未満	服用しないでください	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

9錠（大人の1日服用量）中

成 分	含 量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg
フルスルチアミン（ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体）として （フルスルチアミン塩酸塩）	25mg 27.29mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	25mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル）	10mg

添加物：グルコサミン塩酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、トウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール

### <成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステル（ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル）によるものです。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

- (1)本製品の購入先
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室  
TEL 0744-28-0021  
受付時間 9：00～16：30（土・日・祝日を除く）

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社  
奈良県橿原市観音寺町9番地の2