第3類医薬品



関節痛 神経痛 腰痛に

コンドロハて。900ゼリー

(ビタミンB1主薬製剤)

ビタミンB1・B2・B6, コンドロイチン硫酸エステルNa配合

〔特 徵〕

- ○神経や筋肉組織の新陳代謝を活発にするビタミンB₁・B₂・B₆に, 軟骨由来成分のコンドロイチン硫酸エステルナトリウムなどを配合した内服薬です。
- ○関節痛や腰痛、肩こり、眼精疲労などのつらい症状に、身体の中からじんわりと効いてきます。
- ○ゼリータイプの製剤ですので、錠剤やカプセルが苦手な方でも服用ができます。
- ○携帯に便利なスティックタイプで、どこでも水なしで服用できます。
- ○服用しやすいアセロラ風味の黄色のゼリー剤です。(1包約10kcal)



使用上の注意

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症		
皮膚	発疹・発赤、かゆみ		
消化器	胸やけ、吐き気、下痢		

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

- ●次の諸症状の緩和:神経痛,筋肉痛・関節痛(腰痛,肩こり,五十肩など),手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- ●脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

●次の場合のビタミンB₁の補給:肉体疲労時,妊娠·授乳期,病中病後の体力低下時









眼精疲労

〔用法・用量〕


成人(15才以上)1回1包,1日1回服用してください。 なお,15才未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2)本品は1回1包、のみきりですので、分割服用しないでください。
- ③服用時、薬剤がのどにつかえることのないように注意してください。なお、必要に応じて水又はお湯で服用してください。
- (4)食前・食後、いずれの服用でもかまいません。

[服用方法]

- ①スティックを立て、切り口から切れ目にそって切り取ってくださ ① い。
- ②切り口をくわえ、指でしぼり出すようにしておのみください。
- ●ゼリータイプの製剤なので水分が出ることがあります。開封時及 び服用時、中身の飛び出しに注意してください。
- ●切り取り部分で唇を切らないように注意してください。



[成 分] 1日量(1包:11g)中

成 分	分 量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg	関節軟骨に働いて,関節部で発生する痛みを緩和します。
チアミン硝化物 (ピタミンB ₁ 硝酸塩)	10mg	
リポフラピンリン酸エステルナトリウム (ピタミンB ₂ リン酸エステル)	15mg	神経や筋肉組織の新陳代謝を促して,肩こりや腰痛,眼精疲 労などの症状を緩和します。
ピリドキシン塩酸塩 (ピタミンB ₆)	45mg	
ニコチン酸アミド	60mg	

添加物:クエン酸水和物,粉末還元麦芽糖水アメ,デキストリン,プロピレングリコール,プルラン,カンテン末,安息香酸ナトリウム,カロブビーンガム,パラオキシ安息香酸ブチル,スクラロース,エタノール,香料,バニリン,pH調節剤,その他1成分

〈成分・分量に関連する注意〉

●本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは成分のビタミンB₂リン酸エステルによるものですので、ご心配ありません。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。 ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11 受付時間 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ http://www.zeria.co.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

3ンドロハイ はゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



