

ピップ 内服液 EX

肩こり・眼精疲労

B1・B2・B6

アスパラギン酸K・Mg配合

30mL 第3類医薬品

服用の際には、よくお読みください。【使用上の注意】【相談すること】 SJ.DY [PNEX01]
1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること。【成分・分量】本品1日量<60mL(30mL×2)>
中 オキソアミチン末…200mg、ビタミンB1硝酸塩…20mg、ビタミンB2リン酸エステ
ル…15mg、ビタミンB6…50mg、ニコチン酸アミド…60mg、アスパラギン酸カリウム・
マグネシウム等量混合物…200mg 添加物：白糖、D-ソルビトール液、スクラロース、
アセスルファムカリウム、クエン酸水和物、酒石酸、メタリン酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム、没食子酸プロピル、香料、エタノール、グリセリン、バニリン●本剤に配合されてい
るビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。【効能】●次の諸症状の緩和：神経
痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労●脚気
[ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又
は薬剤師に相談すること。]●次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳
期、病中病後の体力低下時【用法・用量】成人(15歳以上)1日2回、
1回1本(30mL)を服用する。●服用間隔は4時間以上おくこと。
●定められた用法・用量を守ること。●小児には服用させないこと。
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない、涼しい所に保
管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容
器に入れかえないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)。(4)
開封後はただちに服用すること。(5)使用期限をすぎた製品は服
用しないこと。【第3類医薬品】販売名：ピップ内服液EX 発売元/
ピップ株式会社 大阪府中央区農人橋2-1-36 〒540-0011お客
様相談室 ☎(06)6945-4427 土・日・祝日を除く 10:00~17:00
(ピップ製品情報)ホームページwww.pip-club.com 製造販売元/
大同薬品工業株式会社 奈良県葛城市新村214-1 〒639-2121

副作用被害
救済制度
0120-149-931
瓶：ガラスキャップ：金属

製造番号

使用期限

