

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤 ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>・E配合

# 新セイムビタン®ゴールド〈カプセル〉

◆新セイムビタン®ゴールドは、吸収のよいビタミンB<sub>1</sub>誘導体ベンフォチアミンを主成分として、ビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>・E、ニコチン酸アミドを配合したビタミン剤です。日常のからだの疲れ・肩こり・手足のしびれ・病中病後の体力低下・目を酷使する人の眼精疲労の緩和に効果があります。このほか、ガンマーオリザノールや加工ダイサン末も有効に効果を補います。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 用法・用量

次の1回量を1日1回、水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上（成人）	1カプセル	1回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量をお守りください。

## 成分・分量

1日量（1カプセル）中

成分	含量	はたらき
ベンフォチアミン（ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体）	100mg	神経を修復し、痛みをやわらげます。
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	3mg	脂質代謝を促進し、神経・筋肉のはたらきを円滑にします。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	25mg	神経伝達物質の合成を促進し、目の疲れ、肩こりをやわらげます。
シアノコバラミン（ビタミンB <sub>12</sub> ）	60μg	末梢神経を修復し、神経痛やしびれをやわらげます。
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム（ビタミンE）	50mg	末梢血管の血行を良くし、しびれをやわらげます。
ニコチン酸アミド	30mg	ビタミンB群の一種で、新陳代謝を高めます。
ガンマーオリザノール	5mg	米ヌカに含まれる成分で、自律神経のバランスを整えます。
加工ダイサン末	20mg	ニンニクの成分で、ビタミンB <sub>1</sub> 、B <sub>6</sub> の吸収を促進します。また血流をよくすることで、関節痛、神経痛、眼精疲労などに効果を発揮します。

添加剤：トウモロコシデンプン、リン酸水素Ca、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、（カプセル本体中：ヒプロメロース、カラギーナン、黄色5号、ソルビタン脂肪酸エステル）含有

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、リボフラビンによるものなので心配はいりません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬㈱ お客様相談室

電話 0120-108871 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**東和製薬株式会社**

和歌山県紀の川市真志川町丸壱1229番地