

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。
パスピタンDX(ビタミンB₁主薬製剤)
使用上の注意(相談すること) 1.服用後、次の
症状があらわれた場合は副作用の可能性があ
るので、直ちに服用を中止し、この製品を持っ
て医師、薬剤師または登録販売者に相談する
こと/皮ふ:発疹/消化器:吐き気・嘔吐・
胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれ
ることがあるので、このような症状の持続ま
たは増強がみられた場合には、服用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師または登録
販売者に相談すること/軟便、下痢 3.1ヵ月
位服用しても症状がよくならない場合は服用を
中止し、この製品を持って医師、薬剤師または
登録販売者に相談すること 成分・分量 1日
量(100mL(50mL×2本))中 ベンフォチアミン
(ビタミンB₁誘導体)100mg、リボフラビノリン
酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)12mg、ピリ
ドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン
酸アミド60mg、オキソアミチン(末(加工大蒜))
200mg、コンドロイチン硫酸ナトリウム900mg
添加物:クエン酸、液糖、ハチミツ、D-ソルビ
トール、還元麦芽糖水アメ、香料(エタノール)
●ビタミンB₂により尿が黄色くなることもある。
効能・効果 ○次の諸症状の緩和:神経痛、
筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、
手足のしびれ、便秘、眼精疲労○脚気(ただし、
これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても
改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に

お問い合わせは0120-875-710まで
www.tokiwayakuhin.co.jp
副作用被害救済制度 055512
0120-149-931 KSJ802

第3類医薬品

パスピタンDX

コンドロイチンビタミンB₁配合

眼精疲労

eyestrain

肩こり

stiff shoulder

腰の痛み

backache



常盤薬品
NOEVIR GROUP

ノンカフェイン

相談すること。]

○次の場合のビタミンB₁
の補給:肉疲労時、妊
娠・授乳期、病中病後の
体力低下時 用法・用量
成人(15才以上)1日2回、
1回1びん(50mL)を服用
すること。<用法・用量
に関連する注意>用法・
用量を守ること。保管お
よび取扱い上の注意 (1)
直射日光の当たらない涼
しい所に保管すること。
(2)小児の手のとどかない
所に保管すること。(3)
他の容器に入れがえない

こと。(誤用の原因になったり品質が変わる。
(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)
生薬を含むため、まれに混濁を生じることが
ありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社

神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元

三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

金属:キャップ ガラス:びん 50mL

使用期限

製造番号

