

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。
アイビタエース(ビタミンB1主薬製剤)

使用上の注意【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／皮膚発疹／消化器吐き気嘔吐胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／軟便、下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量【100mL(50mL×2)】中

ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)40mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、ニコチン酸アミド60mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900mg、オキソアミジン末(加工大蒜)50mg 添加物：液糖、D-ソルビトール、ハチミツ、pH調整剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、バニリン、プロピレングリコール) ●ビタミンB2により尿が黄色くなることもある。

常盤薬品工業株式会社

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5
お問い合わせは 0120-875-710まで

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

50mL 金属:キャップ 056120
ガラス:瓶 KSC902

HapYcom
ハピコム

眼精疲労

すっきりブルーベリー風味
ノンカフェイン
ベンフォチアミン
コンドロイチン



肩こり・腰痛

第3類医薬品

常盤薬品



アイビタエース

効能・効果

○次の諸症状の緩和:眼精疲労、神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘
○脚気(ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。)
○次の場合のビタミンB1の補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

成人(15才以上)1日2回、1回1びん(50mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)生薬を含むため、まれに湿濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

使用期限
製造番号

