

押してあげる

### ■効能・効果

●次の諸症状の緩和・神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み） ●脚氣[ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。]

●次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

### ■用法・用量

成人（15歳以上）は、1回2錠を1日3回、食後に服用してください。15歳未満は服用しないでください。

### ■成分・分量（1日量（6錠）中）

チアミン硝化物（ビタミンB<sub>1</sub>硝酸塩）…30mg  
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB<sub>6</sub>塩酸塩）…30mg  
ニコチン酸アミド……………30mg  
ガンマ-オリザノール……………10mg  
コンドイチン硫酸エステルナトリウム…200mg  
添加物としてグルコサミン塩酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスボビドン、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク及び黄色三酸化鉄を含む。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するためのものですので、開封後に捨ててください。
- ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は乾燥剤です。服用しないでください。
- 服用のつどビンのキャップをしっかり閉めてください。（吸湿し品質が変わることがあります。）
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヵ月以内の服用を目安にしてください。

お問い合わせ先  
株式会社ジェネリック薬品  
お客様相談室

☎0120-107-111

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日を除く）

発売元 株式会社ジェネリック薬品  
東京都中央区日本橋本石町4-2-16  
製造販売元 準薬化学工業株式会社  
奈良県大和高田市旭南町2番25号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-9311（フリーダイヤル）

AS3709200423

ビタミン製剤

# 関節痛

ひざこし  
神経痛

## コングルコンEX

180錠

第3類医薬品

ビタミン製剤

# 関節痛

ひざこし  
神経痛



痛みの緩和に飲んで効く

## コングルコンEX

30日分 180錠

第3類医薬品

服用前にこの説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

### △ 使用上の注意

#### ☎ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用期限

製造番号



紙



箱



詰め物