

## 使用上の注意

1ヵ月位服用しても症状がよくなる  
ない場合は服用を中止し、この製品  
を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください。

## 用法・用量

大人(15歳以上)1回1瓶(50mL)を  
1日1～2回服用してください。2  
回の場合は、服用間隔を4時間以  
上おいてください。  
※定められた用法・用量をお守り  
ください。

## 効能・効果

次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉  
痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十  
肩など)、手足のしびれ、便秘、  
眼精疲労、脚気「これらの症状に  
ついて、1ヵ月ほど使用しても改  
善がみられない場合は、医師又  
は薬剤師に相談してください。」  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中  
病後の体力低下時のビタミンB<sub>1</sub>  
の補給。

## 保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい  
所に保管してください。2.小児の  
手の届かない所に保管してくだ  
さい。3.使用期限を過ぎた製品  
は服用しないでください。

※本剤は、コンドロイチン硫酸ナ  
トリウムを多く配合しています  
ので、わずかに混濁、沈殿を生じ  
ることがありますが、薬効には変  
わりありません。よく振って服用  
してください。

S1311E

# LIFE BACE

ライフベース

関節痛・眼精疲労・肩こりに



50mL

コンドロイチン  
ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub> 配合

第3類医薬品

1本当りカロリー  
22kcal

## 成分・分量(1瓶50mL中)

コンドロイチン硫酸ナトリウム  
●450mg

チアミン硝酸物  
(ビタミンB<sub>1</sub>)●10mg

リボフラビンリン酸エステルナ  
トリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)●7.5mg

ピリドキシン塩酸塩  
(ビタミンB<sub>6</sub>)●25mg

ニコチン酸アミド●30mg

添加物として白糖、D-ソルビ  
トール、還元麦芽糖水アメリ  
カン酸、dl-リンゴ酸、安息香  
酸Na、パラベン、エタノール、  
香料を含有します。

※本剤に配合されているリボ  
フラビンリン酸エステルナ  
トリウムにより尿が黄色くなる  
ことがあります。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:瓶  
金属:キャップ



製造販売元  
日野薬品工業株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119  
お問い合わせ先 ●お客様相談窓  
口  
電話/0748-52-1232  
受付時間/9:00～17:00

使用期限

製造番号

