



肉体疲労時のビタミンB₁補給

**関節痛、腰痛、
神経痛、肩こり痛、
眼精疲労**

の緩和

50mL×10

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

第3類医薬品

肉体疲労時のビタミンB₁補給 **関節痛、腰痛、神経痛の緩和**

【使用上の注意】 【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気〔ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。〕
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

- 大人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用する。
- 用法及び用量を厳守すること。

販売名：ビタラッシュ内服液

【成分・分量】 1日量〔100mL<50mL×2〕中

ベンフォチアミン（ビタミンB₁誘導体）60mg、リボフラビン（ビタミンB₂）4mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）40mg、ニコチン酸アミド60mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム400mg、添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸、エデト酸カルシウム二ナトリウム、香料、アルコール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリンを含有します。

●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）、
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

¥3,000+税

使用期限

Lot No.



製造販売元 **KINYO 金陽製薬株式会社**
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

販売名：ビタラッシュ内服液

【使用上の注意】【相談すること】

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 ● 次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ● 脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」 ● 次の場合のビタミンB₁の補給：肉
体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】
大人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用する。

● 用法及び用量を厳守すること。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

肉体疲労時の **ビタミンB₁補給**

肩こり痛 腰痛の緩和

50mL

第3類
医薬品

コンドロイチン
400
mg
(1日量配合)

ビタミンB₁誘導体
60mg
(1日量配合)

ビタラッシュ内服液

【成分・分量】

1日量 [100mL (50mL×2)] 中
ベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)
60mg、リボフラビン(ビタミンB₂)
4mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)
40mg、ニコチン酸アミド60mg、
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
400mg、添加物としてクエン酸、DL-
リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息
香酸、エデト酸カルシウム二ナトリウム、
香料を含有します。●本剤に配合されて
いるリボフラビンにより、尿が黄色になる
ことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。



製造販売元

Kinyo 金陽製薬株式会社

奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

ガラス:ビン、金属:キャップ

使用期限

Lot No.

