



この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

肩こり・目の疲れ・腰痛、肉体疲労時のビタミンB1 補給に

第3類医薬品

ビタミンB1主薬製剤(天然型ビタミンE・アミノ酸) 配合

ベリックスBEアミノ

 シオノギヘルスケア

ベリックスBEアミノは、エネルギー代謝に関与する吸収の良いジセチアミン塩酸塩水和物* (セトチアミン塩酸塩水和物: ビタミンB1 誘導体) を主成分とし、これに神経・筋肉の円滑な働きに必要なビタミンB2、ビタミンB6 およびビタミンB12と末梢の血行を高める天然型ビタミンE (コハク酸d-α-トコフェロール) およびアミノ酸の一種で、エネルギー代謝に関与するアスパラギン酸を配合しています。これらの成分により、肩こり、目の疲れ、腰痛などの症状緩和に効果を発揮し、肉体疲労時のビタミンB1 補給に役立ちます。

*シオノギ研究所で開発されたビタミンB1 誘導体。



使用上の注意……

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
軟便、下痢、便秘
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

○次の諸症状の緩和

筋肉痛・関節痛(肩こり、五十肩、腰痛など)、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労、便秘

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。」

○次の場合のビタミンB1の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

……用法・用量……

次の量を食後に水またはぬるま湯でおのみください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2～4錠	1回
11才以上15才未満	2錠	
7才以上11才未満	1～2錠	
7才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

……成分・分量……

ベリックス BE アミノは、うすいだいだい色のフィルムコーティング錠で、4錠(成人1日最大量)中に次の成分を含有しています。


成分	含量(4錠中)
ジセチアミン塩酸塩水和物 (セトチアミン塩酸塩水和物:ビタミンB ₁ 誘導体)	120mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	10mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	60μg
コハク酸 <i>d</i> - α -トコフェロール(天然型ビタミンE)	100mg
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	400mg

添加物としてモノラウリン酸ソルビタン、セラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三酸化鉄、三酸化鉄を含有しています。

- 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
(ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めてください)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨ててください。
- (5) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤に付くと、表面のコーティングの一部が溶けることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにしてください。
- (7) 一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にこ使用ください。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
シオノギヘルスケア株式会社【医薬情報センター】
電話:大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間:9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

®:登録商標

販売元
シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元
生晃栄養薬品株式会社
大阪市西淀川区蛸里2丁目3番28号