



この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

肩こり・目の疲れ・腰痛、肉体疲労時のビタミンB1補給に

第3類医薬品

ビタミンB1主薬製剤(天然型ビタミンE・アミノ酸)配合

ベリックス® Beプラス

○ シオノギヘルスケア

ベリックスBeプラスは、エネルギー代謝に関与する吸収の良いセトチアミン塩酸塩水和物*を主成分とし、これに神経・筋肉の円滑な働きに必要なビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12およびニコチン酸アミドと末梢の血行を高める天然型ビタミンE(コハク酸d- α -トコフェロール)およびアミノ酸の一種で、エネルギー代謝に関与するアスパラギン酸を配合しています。

これらの成分により、肩こり、目の疲れ、腰痛などの症状緩和や肉体疲労時のビタミンB1補給に効果を発揮します。

*シオノギ研究所で開発されたビタミンB1誘導体



使用上の注意……



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

軟便、下痢、便秘

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

5. 服用後、生理が予定より早くしたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

○次の諸症状の緩和

筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れおよびそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)、便秘

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。」

○次の場合のビタミンB1の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

……用法・用量……

次の量を食後に水またはぬるま湯でおのみください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2~4錠	1回
11才以上15才未満	2錠	
7才以上11才未満	1~2錠	
7才未満	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

……成分・分量……

ベリックス Be プラスは、うすい赤色のフィルムコーティング錠で、4錠(成人1日最大量)中に次の成分を含有しています。


成 分	含量(4錠中)
セトチアミン塩酸塩水和物(ビタミンB1誘導体)	125mg
リボフラビン(ビタミンB2)	10mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg
シアノコバラミン(ビタミンB12)	60μg
ニコチン酸アミド	60mg
コハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	100mg
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	400mg

添加物としてモノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロビルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄を含有しています。

●本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります、これは本剤に含まれるビタミンB2が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるため心配ありません。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
(瓶のフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めてください)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨ててください。
- (5) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤に付くと、表面のコーティングの一部が溶けることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにしてください。
- (7) 一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用ください。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話: 大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間: 9時~17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

®:登録商標

販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元

生晃栄養薬品株式会社

大阪市西淀川区姫島2丁目3番28号