

第3類医薬品

アリナリポピン内服液

使用上の注意 **相談すること**

しばらく服用しても症状がよくなりえない場合には医師または薬剤師に相談してください。

〔成分・分量〕1日量2本(40mL)中

チアミン硝酸物	20mg
リボフラビン	4mg
ピリドキシン塩酸塩	30mg
ニコチン酸アミド	40mg
トコフェロール酢酸エステル	12mg
加工大蒜	30mg

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料を含有します。

〔用法・用量〕

大人(15歳以上)1回1本(20mL)を1日2回朝夕服用します。

〔効能・効果〕

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
脚気

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔保管及び取扱上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

製造販売元



大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

眼

精疲労

肩

こり

腰

痛

神経痛に

アリナリポピン

内服液

肉体疲労時・体力低下時の
ビタミンB₁の補給に

20mL×2

第3類医薬品



製造販売元
大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

EYE STRAIN

STIFF SHOULDER

NEURALGIA

BACKACHE

箱：ラベル
紙：アルミ
キャップ：ガラス
ビン

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

【お客様相談窓口】

商品に関するご質問・お問い合わせ

☎0558-271-9481(9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)