

第3類医薬品

アリナリポピン内服液

使用上の注意 相談すること

1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労、脚気

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 大人（15歳以上）1回1本（20mL）を1日2回朝夕服用します。

【成分・分量】 1日量2本（40mL）中

チアミン硝化物	20mg
リボフラビン	4mg
ピリドキシン塩酸塩	30mg
ニコチン酸アミド	40mg
トコフェロール酢酸エステル	12mg
加工大蒜	30mg

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。

製造販売元



大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

発売元



厚生連

眼 精疲労

肩 こり

腰 痛

神経痛に

アリナリポピン 内服液

EYE STRAIN

STIFF SHOULDER

NEURALGIA

BACKACHE

肉体疲労時・体力低下時の
ビタミンB₁の補給に

20mL×2

発売元

第3類医薬品



厚生連