

△【使用上の注意】  相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労●脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

眼精疲労 第3類医薬品

肩こり・腰痛の緩和

コリサール

眼肩腰

肉体疲労時の ビタミンB₁ 補給に

ベンフォチアミン
138mg(100mL中)配合

販売名

コリサール内服液

【成分・分量】1日量
100mL(50mL×2)中
ベンフォチアミン138mg、
オキソアミチン末(加工ダ
イサン)200mg、リボフラ
ビンリン酸エステルナトリ
ウム(VB₂)15mg、ピリド
キシン塩酸塩(VB₆)50mg、
ニコチン酸アミド60mg、
アスパラギン酸カリウム・マ
グネシウム400mg、添加物：
エト酸Ca/2Na、白糖、果
糖、D-ソルビトール、ト-メン
トール、クエン酸、d-リンゴ酸、
パラベン、塩酸、エタノール、
プロピレングリコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

お客様相談室：0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

02CRELAJ