

販売名 ビルトンゴールド

△【使用上の注意】 ■【相飲すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。飲後、下痢、3.1ヵ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●副交感神経系【ただし、これらの症状については、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。】●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用してください。服用期間は4週間以上おいてください。

ガラス：ピン 金属：キャップ
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室 電話 0565-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

■神経痛・手足のしびれ・便秘・眼精疲労の緩和
■肉体疲労時のビタミンB₁の補給

ビルトンゴールド

BILTON GOLD

第3類
医薬品

ベンゾチアミン
138mg(100mL中)配合

肩こり
腰痛
眼精疲労
肩腰眼

50mL



製造販売元
中外医薬生産株式会社
三庫県伊賀市ゆめが丘7-5-5

【成分・分量】1日量
100mL(50mL×2)中
ベンゾチアミン138mg、
オキソアミチン末(加工
大箱)200mg、リボフ
ラビリン酸エステルナ
トリウム15mg、ピロキ
シン塩酸塩50mg、ニコ
チン酸アミド60mg、ア
スバラギン酸カリウム
マグネシウム400mg、
酒石酸エチルヘンタ
ナート、白糖、D-ソルビト
ール、トリエチルアミン、
塩化エタノール、プロピ
ルアルコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。
02BGELCH

製造番号

使用期限

