

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

# アシンコシン

## 関節痛、腰痛、神経痛に

### 特 徴

アシンコシンは、加齢とともにあらわれる、ひざなどの関節痛や腰痛、神経痛に徐々に効果を発揮する医薬品です。

- コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは、軟骨のクッションとなる弾力性や保水性を高めるとともに、軟骨成分の合成を促し、関節痛や神経痛などのつらい症状を緩和します。
- ビタミンB<sub>1</sub>誘導体のチアミンジスルフィドは、体内でビタミンB<sub>1</sub>に変換されて筋肉や神経のスムーズな働きを促し、関節痛や神経痛などを緩和します。
- ビタミンB<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>が関節痛や神経痛の症状の緩和を助けます。
- ヨーグルト味で甘味のある、飲みやすい顆粒剤です。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚 気  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 【成分・分量】 1日量(3包)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg
チアミンジスルフィド(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	12mg
ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル	10mg
ビタミンB <sub>6</sub>	10mg
ビタミンB <sub>12</sub>	60 $\mu$ g
添加物：グルコサミン塩酸塩	1000mg
結晶セルロース	300mg
ヒプロメロース	120mg
ヒドロキシプロピルセルロース	50mg
アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)	10mg
乳糖水和物	適量
香料	微量

## 【用法・用量】

次の量を、1日3回、食後に服用すること。


年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳)以上	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
7歳未満	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。また、1包を分割した残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



◆お問い合わせ先◆ お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」 電話 0744-33-8855  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)