



【使用上の注意】

ビタミンB₁主薬製剤



相談すること

次の場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

【効能又は効果】

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
○脚氣「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。」

○次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

発売元 福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

製造販売元 大和合同製薬株式会社

奈良県橿原市川西町632-1

お問い合わせ先 ☎0744-27-3325

AM9:00～PM5:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用期限

製造番号

神経痛・手足のしびれ・
肉体疲労時のビタミンB₁補給

肩こり・腰痛・眼精疲労

コンドロイチン[®] 醜

ビタミンE | ビタミンB₁

ビタミンB₂ | ビタミンB₆

パス・スカール[®]

第3類医薬品

50mL

販売名：パス・スカール

【成分及び分量】1日量(100mL(50mL×2瓶))中

チアミン硝化物(ビタミンB₁)20mg

リボフラビン(ビタミンB₂)2mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg

ニコチン酸アミド60mg

LiAs(ラギン)マグネシウム・カリウム400mg

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム180mg

オキソアミジン末(加工大蒜)200mg

酢酸D-α-トコフェロール

(ビタミンE)100mg

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、

クエン酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、ブチル

パラベン、プロピレングリコール、エタノール、

香料、その他1成分（アルコール0.5mL以下）

●本剤に配合されているリボフラビンにより尿

が黄色になることがあります。

【用法及び用量】

大人(15歳以上)1回1瓶(50mL)を1日2回朝

夕服用してください。

〈用法及び用量に関する注意〉

(1)定められた用法及び用量をお守りください。

(2)他のビタミン等を含有する製品を同時に服用

する場合には過剰摂取等に注意してください。

(3)15歳未満は服用しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない所に保管してください。

2.小児の手の届かない所に保管してください。

3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因

になったり品質が変わります。)

4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

5.生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。

6.加温・冷凍はさけてください。