

関節痛・神経痛・五十肩・腰痛 つらい痛みの緩和に


飲んで効く

プログルコンEX錠 ゴールド

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合 ビタミンB₁主薬製剤 **第3類医薬品**

なぜ関節が痛くなる?

関節軟骨が加齢とともにすり減ることが、原因のひとつだと考えられます。



特 徴

- プログルコンEX錠ゴールドは、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムやビタミンB₁・B₆、ビタミンE、ニコチン酸アミドの5つの有効成分が、痛みの原因にしっかり働きかけ、ひざ・腰・肩などの関節痛や神経痛を緩和するお薬です。
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは、身体の中、特に関節軟骨に多く存在し、弾力性の保持や保水性を与えます。さらに、細胞の新陳代謝(栄養を取り入れたり、老廃物を排泄すること)に関与しています。
- ビタミンB₁(フルスルチアミン塩酸塩)・ビタミンB₆(ピリドキシン塩酸塩)、ニコチン酸アミドは、筋肉や神経組織の新陳代謝を活発にして、痛みを緩和します。
- ビタミンE(トコフェロールコハク酸エステルカルシウム)は、過酸化脂質の生成を抑制し、血液循環を改善することで、肩こりや手足のしびれなどの症状を緩和します。
- 服用しやすいフィルムコート錠で、1日2回の服用で効果を発揮します。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、口内炎
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み) ●脚氣「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」 ●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時
(必ず裏面もお読みください)

用法・用量

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3錠	1日2回食後に 水またはぬるま湯で服用してください。
15才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉○定められた用法・用量を守ってください。

成分・分量

1日量(6錠)中


成分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	900mg	関節軟骨に多く存在して、関節痛や 神経痛などを緩和します。
フルスルチアミン塩酸塩 (フルスルチアミンとして)	30mg (27.48mg)	筋肉や神経組織の新陳代謝を促して、 筋肉痛や神経痛などの症状を緩和しま す。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆ 塩酸塩)	20mg	
ニコチン酸アミド	50mg	
トコフェロールコハク酸 エステルカルシウム (コハク酸dl- α -トコフェロールとして)	50mg (48.3mg)	血液循環を改善して、肩こりや手足の しびれなどの症状を緩和します。

添加物:結晶セルロース、乳糖水和物、ヒプロメロース、塩酸グルコサミン、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール、タルク、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は湿気を吸いやすく、変色など品質に影響を与えることがありますので、下記のことにご注意ください。
 - 服用のつど必ずキャップをよく閉めてください。
 - 濡れた手で触れないでください。

●錠剤を取り出す際には、手に取り出さずにキャップに取り出してください。



- 瓶の中に乾燥剤が入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないでください。また、間違えて服用しないように注意してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
 - (6)箱と瓶の「開封年月日」記入欄に、瓶を開封した日付を記入してください。

【包装】186錠(31日分)

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
株式会社 日本薬師堂
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-2-12
電話 0120-894-894(通話料無料フリーダイヤル)
9:00~17:00(年中無休) ※年末年始を除く
ホームページ nihonyakushido.com

【副作用被害救済制度お問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

株式会社 日本薬師堂

東京都目黒区青葉台3-2-12

製造販売元

渡辺薬品工業株式会社

富山県富山市水橋北馬場1番7

版No. E21