

アンダーライン部分は2022年11月に追記しました。

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤

コンドロイチン硫酸Na900mg

ビニ-900

〈カプセル〉

◆**ビニ-900**は、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムを1日量（4カプセル）中に900mg配合したビタミン剤で、関節痛や神経痛、腰痛、肩こりなどの諸症状の緩和に効果をあらわします。関節の軟骨は加齢によってすり減り、それが原因で炎症が起き関節が痛んだりすることがあります。配合されているコンドロイチン硫酸エステルナトリウムは、関節の痛みの改善を促すと言われています。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）
脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の1回量を1日2回、朝夕に水またはぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	2カプセル	2回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1日量（4カプセル）中

成分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg	関節の痛みをやわらげます。
ベンフォチアミン(ビタミンB ₁)	100mg	糖質の代謝に関与し、筋肉の疲労回復を助けます。 また、神経機能の維持に関与します。
リポフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂)	12mg	脂質代謝を促進し、神経・筋肉のはたらきを円滑にします。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg	神経伝達物質の合成を促進し、目の疲れ、肩こりをやわらげます。
ガンマーオリザノール	10mg	自律神経に働きかけ、腰痛や関節痛などをやわらげます。
加工ダイサン末	60mg	ニンニクの成分で、ビタミンB ₁ 、B ₆ の吸収を促進します。また血流をよくします。

添加物：乳糖水和物、ポビドン、ゼラチン、ラウリル硫酸Na含有

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、リポフラビン酪酸エステルによるものなので心配はいりません。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
電話 (048)648-1118 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

11AK00