

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB₁製剤 フルヘルス

フルヘルスの主成分であるビタミンB₁誘導体フルスルチアミンは、腸からよく吸収され、体内で役立つ型のビタミンB₁になり、疲れた体にすぐれた効きめをあらわします。フルヘルスにはフルスルチアミンの他にビタミンB₂、B₆、B₁₂とγ-オリザノールを配合した服用しやすい黄色の糖衣錠です。黄色4号（タートラジン）を使用しています。7歳から服用出来ます。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2) 薬によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、ぜんそく等）を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	悪心・嘔吐、口内炎

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

- ##### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
- 軟便、下痢

〔効能又は効果〕

- ・ 次の諸症状の緩和
神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- ・ 脚気
「ただし、上記の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」
- ・ 次の場合のビタミンB₁の補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法及び用量〕

次の量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～3錠	1 回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

裏面もお読みください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

〔成分及び分量〕

3錠（成人の1日最大服用量）中

成 分	分 量
フルスルチアミンとして （フルスルチアミン塩酸塩）	100mg (109.16mg)
ビタミンB ₂ （リボフラビン）	12mg
ビタミンB ₆ （ピリドキシン塩酸塩）	20mg
ビタミンB ₁₂ （シアノコバラミン）	60μg
γ-オリザノール	10mg

添加物：結晶セルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、沈降炭酸カルシウム、カオリン、白糖、アラビアゴム末、ゼラチン、酸化チタン、カルナウバロウ、ミツロウ、黄色4号（タートラジン）

〔成分に関連する注意〕

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂（リボフラビン）によるものですので心配ありません。

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること（詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものであるが、湿気を含み品質が変わるものになる）。
- (5)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること（吸湿し品質が変わる）。
- (6)期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7)箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から、開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。

〔お問い合わせ先〕

ユニテックメディカル株式会社「お客様相談窓口」

住 所 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町9番23号

電 話 ☎ 0120-324-117

受付時間：10:00～16:00（土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始を除く）

製造販売元

ユニテックメディカル株式会社
奈良県高市郡高取町車木323-1