

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

腰痛・関節痛・神経痛に

ルキナミンフレックスDX

LUKINAMIN Flex DX

ビタミンB₁主薬製剤
コンドロイチン硫酸ナトリウム配合

ルキナミンフレックスDXは、腰痛、ひざなどの関節痛や神経痛に効く医薬品です。軟骨成分であるコンドロイチン硫酸ナトリウムは、補うことで軟骨の弾力性や保水性を高め、痛みを改善してくれます。脂溶性で体内への吸収が良いベンフォチアミン（ビタミンB₁誘導体）は、神経の働きを支える大切な成分で、神経痛などの諸症状を緩和します。さらに、ビタミンB₂、ビタミンB₆に、補酵素となるバントテン酸カルシウムを加えることにより、エネルギーの産生効率を高めて、関節などの痛みにも効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

<効能・効果>

次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB₁の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

<裏面もお読みください>

<用法・用量>

次の量を1日3回、朝昼晩食後に服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 3錠 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないこと | |

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 15才未満の小児には使用しないでください。
- 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

<成分・分量>

1日量（9錠）中

| 成 分 | 分 量 |
|---|---------|
| コンドロイチン硫酸ナトリウム | 900mg |
| ベンフォチアミン（ビタミンB ₁ ）（チアミン塩化物塩酸塩として100mg） | 138.3mg |
| リボフラビン（ビタミンB ₂ ） | 12mg |
| ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ） | 20mg |
| パンテン酸カルシウム | 24mg |

添加物：塩酸グルコサミン、乳酸Ca、トウモロコシデンプン、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、セルロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、グリセリン、黄色5号、カルナウバロウ

成分・分量に関連する注意

ビタミンB₂は、体内に吸収されその一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色くなることがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先

おくすり相談室

☎0120-419-111

9時～18時(日、祝日を除く)

製造販売元 新日本製薬株式会社
福岡県福岡市博多区吉塚8-7-11

発 売 元 新日本製薬株式会社 本社
福岡県福岡市中央区大手門1-4-7