

ビンの中の詰め物は錠剤の破損防止用です。
開栓時に捨ててください。

ひざ・腰などのつらい 関節痛や神経痛 を緩和



クミアイ

第3類医薬品

ビタミンEスG錠

01238(46)2013

日自去降開

ビタミンEスG錠 第3類医薬品

ビタミンB1主薬製剤

効能・効果

○ 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）

○ 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

○ 次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

成分・分量 1日量(9錠)中

フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB1誘導体)	109.16mg
リポフラビン酪酸エステル (ビタミンB2)	12mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	30mg
シアノコバラミン (ビタミンB12)	60 µg
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	900mg

添加物として、塩酸グルコサミン、セルロース、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三酸化鉄を含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉

リポフラビン酪酸エステル(ビタミンB2)により尿が黄色くなる場合がありますが、心配はありません。

ひざ 関節 腰 痛



クミアイ

第3類医薬品

ビタミンEスG錠

肉体疲労時
のビタミンB1の補給

眼精疲労

肩こり・神経痛
手足のしびれ

コンドロイチン硫酸エステルNa

フルスルチアミン塩酸塩

270錠

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口

☎ 0238(46)2013

月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

製造販売者 協同薬品株式会社

山形県東置賜郡川西町大字西大塚930

押し
あける

用法・用量

次の量を、朝昼晩、食後に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	3錠	1日3回
11歳～14歳	2錠	
7歳～10歳	1錠	
7歳未満	×服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- 服用のつどキャップをよくしめてください。
- ビンの中の詰め物は、キャップをあげた後は捨ててください。(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

2203-1



4 908010 202215



使用期限

XX-X000X

1