

コリホンゴールド内服液

△【使用上の注意】 相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。関係部位：消化器 症状：吐き気、嘔吐 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】 1.次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 2.脚気「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」 3.次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法及び用量】 成人（15歳以上）1回1瓶（30mL）、1日2回朝夕服用する。●用法及び用量を厳守してください。

【成分及び分量】 1日量〔2瓶（1瓶30mL）〕中

ベンフォチアミン	100mg
リポフラビン	10mg
ピリドキシン塩酸塩	50mg
ニコチン酸アミド	50mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	200mg
オキソアミチン末	50mg
添加物：粉末還元麦芽糖水アメ、還元麦芽糖水アメ、ハチミツ、D-ソルビトール液、クエン酸、DL-リンゴ酸、エドト酸カルシウムニナトリウム、ポリオキシエチレン〔160〕ポリオキシプロピレン〔30〕グリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、プロピレングリコール、カラメル、エタノール、ミツロウ、バニリン、香料	

【保管及び取扱い上の注意】 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

肉体疲労時のビタミンB₁補給

コリホンゴールド 内服液

第3類医薬品



(肩こり、五十肩、腰痛)
眼精疲労の緩和に

使用期限
製造番号

お問い合わせ先
日新薬品工業株式会社
お客様相談室 ☎0120-415-688
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス：瓶 金属：キャップ
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1